© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Tausch-Catalog

der deutschen malakozoologischen Gesellschaft.

(NB. Die Preise in Reichsmark per Stück.)

	ℳ		ℳ
Conchylien aus Japan.		Turbo rusticus, Gmel.	0,10
NB. Einige, früher angezeigte, erniedrigt.		Rotella costata, Val.	0,30
		— monilifera, Lm.	0,15
Ranella perca, Perry. etw. bes.	10,—	Monodonta labeo, L.	0,40
Triton succinctum (olearium, L.)	1-2,—	Euthria viridula, Dkr.	50-0,70
— nodiferum, v. Sauliae, Rve.	2-2,50	Haliotis gigantea, Chm.	2.—
		ditto v. discus	3,—
— Dunkeri, Lischke.	1.50-2.50	Haliotis intertexta, Lske.	1,50
Cancellaria Spengleriana, Desh.	1-2,—	Patella nigro-lineata, Rve.	0,50
		— toreuma, Rve.	0,30
Fusus inconstans, Lske (kl.)	1,—	Siphonaria? sp.	10-0,15
Nassa festiva, Pow.	0,30	Acmaea Schrenkii, Lske.	0,30
— livescens, Phl.	0,30	— persona, Esch.	04,0
— gracilis, Pease.	0,50	Capulus australis,	0,40
Purpura clavigera. Lske.	20-0,50	Dentalium hexagonum, Gould	0,30
— Bronnii, Dkr.	30-0,80	Terebratula Koreana,	3,—
— luteostoma Chm.	40-0,80	Rhynchonella psittacina, Dkr.	2,—
Cassis zebra, Gmel.	2-3,—	Lingula anatina, Lm.	1,20
Dolium luteostoma, Küster	1-1,50	Mytilus Grayanus, Dkr.	50-1,—
Conus fulmen, Rve.	1-2,—	— hirsutus, Lm.	0,50
Pleurotoma? sp.	1-2,—	Septifer bilocularis	0,30
Natica Powisiana, Recl.	60-1,—	Arca subcrenata, Lischke.	1,50
— pellis tigrina, Chm.	50-1,—	— inflata, Rve. etw. bes.	2-3,—
— Lamarckiana, Recl.	2-5,—	Barbatia candida, Chm.	0,60
— ? sp.	0,30	Pectunculus albolineatus für 2 Schalen	0,50
Lampania multiformis, Lske.	0,40	Corbicula (Cyrene) japonica	0,50
— zonalis, Brug.	20-0,30	Venus Römeri, Dkr.	60-1,—
Vertagus Kochii, Phil.	20-0,30	— Yeddoensis, Lske.	1,20
Phorus pallidulus, Rve.	3,—	Tapes philippinarum, Adms.	20-0,40
Litorina brevicula, Phil.	0,20	— Graeffii, Dkr. nov. sp.	3-5,—
Nerita pica, Gould.	0,30	Cytherea petechialis, Lam.	60-1,—
— albicilla, L.	0,10	— lusoria, Lam.	60-1,—
Turbo cornutus, Gml.	1-1,50	Meroe (Sunetta) excavata, Hnly.	1-3,—
— columellaris, Phil.	0,80-1		
— japonicus	—	Gomphina melanaegis, Rve.	2-3,50

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

	ℳ		ℳ
Cyclina chinensis, Chm.	80-1,—	Conus aurora, Lam. u. v.	2-3,—
Trigonella Grossei	60-0,80	— obscurus, Humph	0,80
Mactra sulcataria, Desh.	80-1,50	— pusillus, Chm	0,40
— veneriformis, Desh.	80-1,—	— miliaris, Brug	0,50
Lithophagus curtus, Hnl.	0,50	— striatus, L.	50-0,80
Soletellina olivacea, Say.	1,50	— ? sp. von Rodriguez	2,—
Balanus? sp.	0,10	Mitra cardinalis, Lam.	1.50-2.-
Policeps mitella, L.	1,—	— pontificalis, L.	80-1,50
		— episcopalis, L.	1-2,—
Conch. v. Mauritius;		— nucea, Gron.	1-2,—
Die mit R. von der Insel		— fulva, Swains	1,—
Rodriguez; M. Madagascar;		— acuminata, „	0,50
C. China.		— ferruginea, Lam.	1,50
Murex clavus, Kien (Prachtstück)	38,—	— rubiginea, Adm. v.	1.60-2,-
		— Cumingii, Rve.	2,—
Murex clavus, Kien (Prachtstück) etw. kleiner	30,—	— pyramidalis „ v.	1.50-2,-
		— tiarella, Sow.	0,60
Murex clavus, Kien, kleiner	15,—	— annulata, Rve.	0,75
— ramosus, L.	2,—	— zephyrina, Duclos	50-0,70
— triqueter, Born	1,50	— cucumerina, Lam.	0,50
— fenestratus, Chm.	4,—	— pacifica, Rve.	0,50
— talienwanensis, Crosse C.	2,—	— speciosa, Rve.	1,20
— tetragonus, Sow.	50-1,—	— procissa, Rve.	0,80
Conus literatus, L. var.	2,—	— lyrata, Lam.	1-1.60
— distans et var.	1-1,80	— medio-maculata, Sow.	0,50
— tulipa, L.	1-1,30	— corallina, Rve.	0.50
— nussatella, L.	0,50	— filosa, Lam.	0,60
— tendineus, Hws., Brug	4,—	— modesta, Rve.	0,50
— ermineus, Born	80-1,—	— luctuosa, Adm., v.	40-0,50
— generalis. var. L.	1-2,—	— rosea, Swains	0,40
— nemocanus, v., Brug	1-1,80	— umbonata, Sow.	1,60
— vexillum, Martini, var. schön	1,80	— clathrata, Rve. v.	1,—
		— amanda, ditto.	0,50
— imperialis, L. var. u. juvenes	40-2,—	— aureolata, Swains	0,40
		— palligera, Sow.	0,30
— pulchellus, Swains.	3-5,—	— ? sp. Nr. 60	3,50
— pertusus, Brug u. var. (rara)	6-10,—	— ? sp. „ 119	0,80
— Julii, Liénard (rara)	8,50	— ? sp. „ 994. Port Alfred.	0,60

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

	Mk		Mk
Mauritia Barclayi, Adm.	6,—	Strombus samarensis, Rve.	1,—
Cypraea testudinaria, L. R.	3-5,—	— Rüppellii, Rve.	0,75
— mappa, L	2,50	— haemastoma, Sow.	30-0,40
— arabica. L.	0,20	— dentatus, L.	70-0,80
— caurica, L.	0,30	— lentiginosus, L. m. Deckel	1,0,—
— staphylea, L. v.	0,30	Nassa coronata, Brug.	0,30
— undata, Lam.	0,25	— arcularia, L.	0,30
— hirundo, L.	0,30	— mucronata, Adams	0,30
— ursellus, Gmel. v.	0,25	— callosa, Adams	0,20
— tricornis, Fide Robillard	1,—	— luctuosa, Adams	0,25
oryza, Lam; neglecta, Sow.;		— horrida, Dkr.	0,20
et cicercula, L. à	0,25	— concinna, Powis?	0,25
Hydatina physis, L.	0,30	— suturalis, Lm.	0,25
Aplustrum thalassiarchi,		— sertula, Adams	0,30
Martini	0,25	— succincta, „	0,35
Terebellum subulatum Lm. v.	0,50	— complanata, Powis,	
Natica areolata, Recl.	0,60	Singapore	0,20
Triton lampas, Lam.	1,—	Lathirus nassatula, Lm. v.	0,30
— rubecula, Lam. var.	0,40	— ? sp. 593 à 25 u. 597	
— clandestinum, Lam.	1.—	à 1 Mk.	—
— chlorostomum, Lam.	0,30	Modulus tectum, Chm.	0,75
— Loroisii, Petit. v.	0,30	Ricinula morus, Lm.	0,20
— tuberosum, Lam.	0,25	Purpura persica, „	0,30
— vespaceum, Lam. v.	0,40	Xenophora conchyliophora,	
— anus, Lam.	0,50	Born	2,—
Dolium olearium, Lam.	0,30	Harpa Cabritii ? Fisch. rara	5,—
Malea pomum, Lam.	0,50	— ventricosa, Lm. v.	2,50
Drillia, verschiedene	30-0,40	— verschiedene Species?	1-2,—
Ranella affinis, Brod.	0,90	Leptoconchus striatus, Rüpp.	1,—
— rhodostoma, Beck	0,60	— Rüppellii, Desh.	1,—
— buffonia, Lam.	0,70	— Robillardi, „	
— siphonata, Rve. v.	1,50	viele varietates	0,80
— anceps, Lam.	0,50	— Lamarckii, Desh.	0,80
Epidromis maculosus, Lam v.	5,—	Pyramidella sulcata, Adams	0,25
— sculptilis, Rve.	0,35	— mitralis, „	0,25
Strombus auris Dianae, L.	1,—	Phasianella variegata, Lam.	0,25
— mauritianus, Lam.	0,50	Haliotis bistriata, Rve.	0,45
— floridus, Lam.	0,30	Patella Adansonii. Dkr.	0,30
— floridus varietas 547	0,70	— rota, Chm.	0,30

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

	Mk		Mk
Akera soluta, Chm.	1,—	Helix touranensis, Sow. Cochinchina.	0,50
Calyptraea tectum sinense, Lam.	0,75	Bulimus annamiticus, Pfr. Cochinchina	0,80
Pileopsis ticaonica, Sow.	0,25	Cyclostoma involvulus Cr. Cochinchina	1,60
Chiton penicillatus Desh.	0,30	— volvulus, Müll. „	2,50
Dolabella Rumphii, Rve.	1,—	— Petiverianus, Gray Cochinchina	1,70
— gigas, Rang.	0,80	Bulimus cambogiensis, Rve. Cambodge	9,—
Oliva ponderosa, Duclos.	0,45	Unio scobinatus, Lea „	1,20
— episcopalis Lam.	0,35	— acutus, Lm. „	1,30
Rotella variegata, L. Singapore	0,10	— ? sp. „	1,80
Pecten noduliferus Sow. varietates	1,50-2,50	Helix brachyplecta, Pfr. Birman	1,80
— diverse ? sp.	50-1,25	Vitrina praestans, Gray „	1,20
Spondylus nicobaricus, Chm,	1,80	Helix cambodgiensis, Pfr. Siam	16,—
— ocellatus, Rve.	1,70	Marginella 5 plicata, Lm. Molukken	1,40
— multisetosus, Rve.	1,50	— undulata, Martini, Saigon	0,80
— zonalis, Lm.	1,60	Helix metaformis, Fér. Philippinen	0,50
Cytherea tigrina, Lam.	0,75	— iloconensis, Sow. „	0,50
Cytherea grata, Desh.	1,90	— annulata, „ „	0,50
Venus ? lyra, Hnly.	0,50	— planulata, Lm. „	0,40
Cardium rugosum, Lam. v.	0,35	— fulgetrum, Brod. „	0,60
— areniculum Rve.	0,95	— rufogaster, Less. „	1,20
— ? sp. No. 909 und 911	0,60	— abax, Marie Neu-Caledonien	1,20
— australe, Rve.	0,40	Bulimus Pancheri, Crosse Neu-Caledonien	1,70
Amphidesma vestalis ? Adms.	0,55	— Souvillei, Morelet, „	4,50
Pedum spondyloideum, Gmel.	2-2,50	— fibratus, Mart. „	1,40
Neritina Mauritiae, Lesson.	0,25	Voluta deliciosa, Montrouzier Neu-Caledonien	13,50
Navicella porcellana, L.	0,20	— Rossiniana, Bernardi Neu-Caledonien	40,—
Bullia semiusta, Rve.	0,45		
Sigaretus planulatus Rve.	0,40		
Pterocera multipes, Desh. Prachtstück	13,—		
Magilus antiquus, Lam.	7,—		
Diverse:			
Helix distincta, Pfr. Cochinchina	1,30		
— Weinkauffiana, Crosse Cochinchina	0,80		

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

	ℳ		ℳ
Helix Parilis, Fér.		Helix pellis serpentis, Pfr.	
Guadaloupe	0,50	Peru	2-2,50
— lychnuchus, Pfr. „	0,70	Neritina nucleolus, Morelet	
— faunus, Phil., Ecuador	2,80	Neu-Caledonien	0,25
Bulimus Hartwegi, Pfr. „	2,80	Helix haemastoma, L.	
— Binneyanus, Pfr. Peru	4,50	Cochinchina	0,25

Literaturbericht.

Dall, W. H., Mollusca of Kerguelens Island. — In Bulletin of the United States National Museum 1876 Nr. 3 p. 42—48.

Enthält die Aufzählung der von Dr. J. H. Kidder bei der Expedition zur Beobachtung des Venusdurchganges gesammelten Mollusken, vierzehn Arten, darunter neu Hemiarthrum setulosum Carp., ein Chitonide, Kidderia minuta Dall, verwandt mit Modiolarca, und Lepton parasiticum Dall. Ausserdem wird der Gattungsname Eatonia Smith als schon bei den Brachiopoden vergriffen in Eatoniella umgewandelt und E. caliginosa Sm. in Smithii umgetauft, da ersterer Name schon durch Gould präoccupirt ist. — Die übrigen Arten sind: Octopus sp., Eatoniella Kerguelensis, Purpura striata Mart., Patinella magellanica Gmel., Patella Delesserti Phil., Hemiarthrum setulosum Carp., Hyalina Hookeri Pfr., Siphonaria tristensis Sow., Lasaea rubra Mtg., Mytilus magellanicus, M. canaliculus. — Von diesen ist L. rubra kosmopolitisch, Purpura striata gemein an Neuseeland, die anderen Arten kommen sämmtlich an der Südspitze Amerikas, M. canaliculus auch an Neuseeland vor. Da Kerguelens Island 120° entfernt von der Südspitze Amerikas liegt, ist diese Gleichmässigkeit der Fauna offenbar ein gewichtiger Beweis für die Existenz einer selbstständigen antarctischen Fauna, welche, im südlichen Eismeer einheimisch, nach den Südspitzen der Continente ausstrahlt. — Zu den von Dall aufgeführten Arten kommen dann noch die von Smith in Annals Mag. Nat. Hist. XVI. p. 67 ff. beschriebenen neuen, 10 an der Zahl, sowie eine von Ed. von Martens in dem Sitzungsbericht der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin am 15. Juni 1875 erwähnte, doch noch nicht beschriebene Margarita.